

Piodermia zgorzelinowa

Agata Ossolińska, Natalia Morawiecka



Opis

- Piodermia zgorzelinowa jest **dermatozą neutrofilową** wywołaną przez proces autoimmunologiczny.
- Okres zachorowania to najczęściej 20 – 50 rok życia, kobiety chorują częściej niż mężczyźni.



Objawy

- Pierwszą obserwowaną zmianą chorobową jest bolesny głęboki guzek lub krostka, zmiany szybko postępują i przeobrażają się w bolesne, trudno gojące się owrzodzenia, które są dobrze odgraniczone.
- Wysięk krwotoczny oraz śluzówkowy.
- W przebiegu choroby można obserwować również gorączkę, bóle mięśni i stawów oraz obniżone samopoczucie
- Szacunkowo u 30% pacjentów, u których występuje piodermia zgorzelinowa ma miejsce zjawisko tzw. **odczynu patergicznego**, polegającego na burzliwym rozprzestrzenianiu się zmiany w skutek niewielkich urazów mechanicznych, zakłucia oraz nacięcia chirurgicznego



Leczenie

- Leczenie miejscowe :
 - Zaopatrywanie powstających owrzodzeń.
 - Miejscowo silne GKS.
- Leczenie ogólne:
 - GKS (prednizolon),
 - Leki immunosupresyjne (Cyklosporyna A, azatiopryna),
 - Antybiotyki (sulfonamidy, wankomycyna, gentamycyna),
 - Antagoniści TNF- α (Inflixymab).
- Leczenie chirurgiczne:
 - Może wywoływać zjawisko patergii.